

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

F O R S T B O T A N I S K H A V E

CHARLOTTENLUND

Gruppevis

p l a n t e f o r t e g n e l s e

med alfabetisk register

over træer og buske

1 9 5 5

I n d h o l d

Forklaring til plantefortegnelsen	0
Fortegnelse over grupperne:	
A	1
B (Østasien)	2
C	8
D (Bøgefam. Stedsegr.varieteteter)	28
E	38
F (Magnolia)	39
RHODODENDRON i grupperne F, G, H og I	40
H (Canada)	46
I	49
K (Nordamerika)	56
L (Acer)	64
M (Østasien)	67
N (Ilex)	69
O (Prunus)	70
STENHØJ	72
P	73
Q	74
R (Ærteblomstrede, Papilionaceae)	75
S (Rhamnus)	79
T	80
U	83
V (Ligusterfam., Oleaceae)	94
Ændringer i den nummer.plantebestand siden 1944	97
Alfabetisk register	100

Forklaring til plantefortegnelsen 1955.

Plantefortegnelsen er udarbejdet pr. februar 1955 på grundlag af den tidligere gruppevise fortegnelse fra 1944, plantningslisterne de flg. år og en nøje gennemgang af grupperne. Den væsentlige ændring i plantebestanden siden 1944 er omtalt side 97-99.

Nummereringen af enkelte og markante træer er bibeholdt ligesom indordningen af de unummererede planter, der er foretaget efter deres placering i gruppen mellem de nummervgivne træer. Ved gennemgangen af gruppen er den bedst mulige fremadskridende og sammenhængende rækkefølge af planterne søgt etableret, hvorved der i enkelte tilfælde er afvejet fra den fortløbende nummerfølge for derved at kunne vedligeholde træernes gamle numre. Kortet over Forsthaven er blevet revideret pr. februar 1955 og giver den nødvendige orientering sammen med de nye navneskilte, der er op-hængt i forbindelse med udarbejdelsen af denne fortegnelse.

De latinske plantenavne er i overensstemmelse med A.Rehder: "Manual -", 1947, hvorfra også arternes udbredelsesområder er hentet. De danske plantenavne er efter Johan Lange: "Plantenavne", 1949. Den botaniske bestemmelse af planterne er for de flestes vedkommen-de udført af magister Johan Lange i 1951. Betegnelsen "Det." (de-termineret) uden initialer og årstal henfører hertil.

Under planternes oprindelse er der for de nyere planter hen-vist med et nummer til Arboretets protokol over indgået plantema-teriale, hvor årstallet samtidig angiver formeringsåret for mod-tagne frø og kviste. "Rafn 1910" betyder frø fra Rafn (Skovfrøkon-toret) 1910, mens årstal i forbindelse med en planteskole angiver det år, vi har modtaget planten. Årstal alene angiver plantningsår.

Til sidst er evt. notater tilføjet under navn og dato. Dr. Syrach Larsens beskrivelse juni 1942 af planternes tilstand efter de strenge vintre 1939-42 er medtaget fra den alfabetiske protokol 1932, dels for de arter, der blev beskadiget, dels for de træer, der klarede sig uventet godt.

Anvendte forkortelser:

AO.	Aksel Olsens planteskole, Kolding
Bot.Have	Universitetets botaniske Have, København
CHO.	Prof.i botanik, dr.phil. C.H.Ostenfeld, Lbh. (Død 1931)
Det.	Determineret, botanisk bestemt
DTP.	D.T.Poulsens planteskole, Kvistgård og Valby
FH.	Forstbotanisk Have. (Evt. flg. bogstav og nummer angiver gruppe og nr. for en plante i haven)
FP.	Forstkand. Fr.Paludan (har udarbejdet plantefortegnelsen)
JL.	Dendrolog, magister Johan Lange, Lbh.
KG.	Prof. i botanik, dr.phil. K.Gram, Lbh.
Lbh.	Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Pl.	Plantet
S.	Såning
SL.	Arboretforstander, dr.agr. C.Syrach Larsen
Stikl.	Stikling
sub.nom.	Modtaget under navn - eller: Tidligere under navn
V.	Vegetativ formering, podning el. stikling

Plantefortegnelsen er duplikeret 1955 i 25 eksemplarer.

Gruppe A

- A 1 *Salix alba* L. Hvidpil. Europa, C-Asien. ♂ Det.JL.51.
Stævnet dec. 1946 da der har vist sig råd i de svære grene og en svamp på stammen.
- A 4 *Viburnum Opulus* var. *roseum* L. Det.JL.51.
- A 5 *Viburnum tomentosum* Thunb. Japan, Kina. Det.JL.51.
- A *Taxus baccata* 'fastigiata aurea'. Det.JL.51. (3 planter)
---oo---
- A *Taxus baccata* var. *stricta* Laws. (T.b.var.fastigiata Loud.). Det.JL.51. (2 planter.)
- A *Philadelphus californicus* Benth. Californien. Det.JL.51.
- A *Deutzia longifolia* Franch. Vestkina. AO.1927. Det.JL.51.
- A 6 *Clerodendron trichotomum* Thunb. Øst-Kina, Japan.
Det.JL.51.
- A *Deutzia gracilis* Sieb.& Zucc. Japan. Det.JL.51.
- A 7 *Buddleia alternifolia* Maxim. NV-Kina. Hillier 1929.
Det.JL.51. F.1940: Næsten udgået, skåret helt ned.
- A *Magnolia stellata* (Sieb.& Zucc.) Maxim. Japan.
Hørsholm planteskole 1944. Det.JL.51.
- A 9 *Paeonia suffruticosa* 'Stuart - Low'. Det.JL.51.
- A *Paeonia lutea* x *P.Delavayi* (?). Frøplante fra Bot.Have.
Det.KG.45: Må være en krydsning mell. P.l.Franch. og en anden Pæon, muligvis P.D.Franch. (begge fra Kina).
- A 8 *Lespedeza Thunbergii* (DC.) Nakai (L.formosa Koehne).
Kina, Japan. 1890. Det.JL.51.
- A *Helwingia japonica* (Thunb.) F.G.Dietr. ♂ Kina, Japan.
Det.JL.51.
---oo---
- A 14 *Juglans Sieboldiana* Maxim. Japan. 1890. Det.JL.51.
Modertræ til krydsningen med *J.cinerea* fra Bot.Have
(jvf. FH.D.61 og Arboretet C.2).

Gruppe B

- B 1 *Metasequoia glyptostroboides* Hu & Cheng Central-Kina.
Frø fra Nanking 1947. Sået 1948 (298/48), pl.1949,
flyttet 1954 fra Ginkgo. Højde marts 1954: 3,70 m.
- B *Magnolia Sieboldii* K.Koch (*M.parviflora* S.& Z.).
Japan, Korea. Stikl. ca.1944 fra Arboretet.
Pl.1954. Det.JL.
- B *Callicarpa japonica* Thunb. Japan. Frø fra Bot.Have
431/1951. Pl.1954.
- B 3 *Cephalotaxus drupacea* Sieb.& Zucc. Japan. 1908. ♀
Det.JL.51 (prof.Tatewaki, Sapporo siger ved besøg
nov.1954: var.nana).
9/6-42: 2-3 stammer helt røde, resten frisk grøn
og skyder godt. Flere selvsåede planter under
busken (tre flyttet til Arboretet aug.52).
- B 4 *Cryptomeria japonica* D.Don. Japan. 1889. Det.JL.51.
9/6-42: Meget stærkt svedet, kun ganske lidt grønt.
To nabotræer af samme parti var helt røde og døde.
9/6-54: Ser ganske frisk ud med undtagelse af en
død top på godt en meter.
Flere frøpl. herfra i FH., et par af disse dværgform.
- B 5 *Cephalotaxus drupacea* Sieb.& Zucc. Japan. 1891. ♂
Det.JL.51 (påfaldende langnålet, men rigtig).
9/6-42: Meget stærkt svedet, brun med grønt.
F.1943: Skåret ned med undtagelse af nogle svære
grene, der nærmest ligger på jorden.
- B 6 *Picea jezoensis* (S.& Z.) Carr. N-Japan, Manch. Det.JL.51
Rosa ruga Lindl. klatrer op i træet.
- B *Chamaecyparis pisifera* var. *squarrosa* (Endl.) B.& H.
1890. Det.JL.51. Stærkt beskåret.
- B 10 *Abies holophylla* Maxim. Korea, Manch. Fra Statens
Forstl. Forsøgsvæsen. Pl.1940. Det.JL.51.
- B *Aucuba japonica* var. *variegata* D'Ombr. Japan.
- B 11 *Metasequoia glyptostroboides* Hu & Cheng Central-Kina.
Frø fra Nanking 1947, s.1948, pl.1949, flyttet 2 m
1954. Højde marts 1954: 3,60 m.

- B 14 *Thujaopsis dolabrata* Sieb. & Zucc. C-Japan. 1889.
Det.JL.51. 9/42: Stærkt svedet.
- B *Thujaopsis dolabrata* var. *nana* Endl. 1890. Det.JL.51.
Flere planter som kant mod vejen.
- B *Chamaecyparis pisifera* var. *filifera* (Sénécl.) H. & R.
(*Retinispora* f. Gord.). Det.JL.51.
- B *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa* (Carr.) Otto.
Stikl. V.132-1937 fra det gamle træ B.20. Flyttet
hertil 1948 fra U. Det.JL.51.
- B *Metasequoia glyptostroboides* Hu & Cheng Central-Kina.
Frø fra Nanking 1947, s.1948, pl.1949.
Højde marts 1954: 2,25 m.
- B *Abies Faxoniana* Rehd. & Wils. Vest-Kina.
- B *Magnolia Sieboldii* K.Koch (*M.parviflora* S. & Z.). Japan,
Korea. Frø fra Arboretet. Pl.1954.
- B *Abies Veitchii* Lindl. C-Japan. S.1919 af frø fra FH.K.14
- B 23 *Larix leptolepis* (S. & Z.) Gord. (*L.Kaempferi* Sarg.).
Japan. 1889. Danmarks ældste eksemplar af denne art.
Det.JL.51.
- B *Celastrus orbiculata* Thunb. (*C.articulata* Thunb.) ♀
Japan, Kina. Stikl.269-1949 fra Arboretet X.40
Pl.1953.
- B *Clematis Viticella* L. Italiensk Skovranke. Klatrer i
Taks nord for B.23
- B *Pseudosasa japonica* (S. & Z.) Mak. Japansk Bambus.
Det.JL.51.
- B 24 *Tsuga diversifolia* (Maxim.) Mast. Japan. 1889.
Det.CHO.22, KG.38 og JL.51. 1942: Let svidning på
mest udsatte del, synes dog næsten ubeskadiget.
- B *Taxus cuspidata* Sieb. & Zucc. Japan, Korea, Manch.
Frost 1933 (sv.til partiet i Arboretet II,loo).
Pl.1948.

- B 25 *Thuja Standishii* (Gord.) Carr. Japan. 1889.
Det.48 (blågrøn type).
- B *Thujopsis dolabrata* Sieb. & Zucc. C-Japan. Stikl. V.203-
1938 fra Hartvig Frisch's have. Pl.1948. Det.JL.51.
- B *Abies Veitchii* Lindl. C-Japan. Frø fra Langesø s.1925.
Pl.ca.1934. Det.JL.51.
- B 26 *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa aurea* (R.Sm.) Otto
Ca.1890. Det.JL.51.
- B *Larix Gmelini* var. *Principis-Ruprechtii* (Mayr) Pilger.
N-Kina, Korea. Podning 124/1952 af træet ved
Arboretets bænkeplads. Pl.1954.
- B 29 *Thuja Standishii* (Gord.) Carr. Japan. 1889. Det.48
(helt typisk) og JL.51.
- B 30 *Chamaecyparis pisifera* var. *filifera* (Sénécl.) Hartw. & R.
(*Retinispora* f. Gord.). 1890. Tilbageslag skåret
bort 1939. Det.JL.51.
- B 31 *Juniperus chinensis* L. Kina, Mongoliet, Japan. ♀
Ca.1890. Det.JL.51.
- oo--
- B 33 *Taxus baccata* var. *Dovastonii* Laws. Ca.1890. (Nær gr.G.)
9/6-42: Helt rød, kun lidt grønt på nederste grene.
24/3-44: Skåret ned efterladende et par fladtstry-
gende grene.
- B *Rubus lasiostylus* Focke Central - Kina.
- B 35 *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa argenta* (Sénécl.) Ot
Ca.1890. Det.JL.51.
Stærkt tilbageslag (hele toppen).
- B 37 *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. Rødel. Europa, Sibirien og
N-Afrika. Gl.træ fra før havens anlæg. Det.JL.51.
- B 44 *Chamaecyparis obtusa* var. *flavo-spicata*. 1890. Det.JL.51
- B *Prunus subhirtella* var. *autumnalis* Mak. Podning fra
Arboretet pl.1951.

- B 45 *Taxus cuspidata* Sieb. & Zucc. Japan, Korea. Manch. ♂
1890. Det.JL.(ant.rigtig - knopskæl spidse, stilk
gullig). 9/6-42: Ubeskadiget.
- B 46 *Abies Faxoniana* Rehd. & Wils. Rock 15084: Frø samlet
okt.1926 i det sydvestlige Kansu, Upper Tebbu distr.
mell. Drjakana og Pandrukika, 2920 m.o.h.. Pl.1944.
- B *Viburnum Carlesii* Hemsl. Korea. Fra AO. Pl.1951.
- B 47 *Chamaecyparis pisifera* var. *squarrosa* (Endl.) Beiss. & H.
1890. Det.JL.51.
17/12-46: Stor del af toppen knækket af i blæsten.
- B 49 *Abies sachalinensis* Mast. N-Japan, Sachalin, Kurilerne.
1890 (sub.nom. *A.Mariesii* Mast.). Det.JL.51.
- B 50 *Taxus baccata* var. *lutea* Endl. 1890. Det.JL.54.
Skåret tilb.1941 af hensyn til naboplanter (ej be-
skadiget af frosten).
- B 53 *Tsuga Mertensiana* (Bong.) Carr. (*T.Pattoniana* Sénécl.).
Nord-Amerika. 1891. Det.JL.51.
- B *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K.Koch Ø- og C-Kina, Korea.
Frø fra Bot.Have 430/1951. Pl.1954.
- B 58 *Ginkgo biloba* L. Ø-Kina. 1889. ♀ Det.JL.51.
9/6-42: Ubeskadiget. 7/12-45: Frugter (50-100)
iagttaget første gang. 27/11-47. Meget frø.
1949: Podet kviste af hantræer fra Gisselfeld og
Arnold Arboret (93/49) i toppen af træet.
- B *Decaisnea Fargesii* Franch. V-Kina. Frø fra FH.E.
Det.JL.51.
- Sti --
- B *Aucuba japonica* var. *variegata* D'Ombr.
- B *Abies sachalinensis* Mast. N-Japan, Sachalin. Det.JL.51.
- B 66 *Picea jezoensis* var. *hondoensis* (Mayr) Rehd. C-Japan.
1890 (sub.nom. *P.ajanensis* Fisch.) Det.KG.38 og JL51
- B 73 *Juniperus chinensis* var. *aurea* Young. 1890. Det.JL.51.

- B 75 *Torreya californica* Torr. ♂ Californien. 1890.
Det.KG.41 og JL.51(sub.nom. *T.nucifera* (L.) S.& Z.).
Meget stærkt svedet efter de strenge vintre 1939-42,
men har rettet sig fuldstændigt.
- B 79 *Pseudolarix amabilis* (Nels.) Rehd. Guldlærk. Ø-Kina.
1890. Det.JL.51.
- B 82 *Juniperus chinensis* L. Kina, Mongoliet, Japan. 1890.
Det.JL.51.
- B *Cephalotaxus Fortunei* Hook. ♀ Central-Kina. 1890.
Det.JL.51. Synes død efter de strenge vintre
1939/42, men er i 1954 frisk.
- B *Cephalotaxus drupacea* var. *fastigiata* (Carr.) Pilger.
Fra Aksel Olsens planteskole ca.1950. Pl.1951.
- B *Cryptomeria japonica* var. *elegans* (H.& H.) Mast.
- B *Abies homolepis* Sieb.& Zucc. Japan. Pl.1948. Det.JL.51.
- B *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa* (Carr.) Otto
Stikl.V.132-1937 fra tidl.FH.B.20. Det.JL.51.
- B 84 *Juniperus virginiana* var. *crebra* Fern. 1890. Det.JL.51.
Rokket i storm marts 1945. Støttet med jernkæde.
- B 87 *Thuja occidentalis* var. *fastigiata* Jaeg. Ca.1890.
Det.JL.51.
- B *Chamaecyparis obtusa* (S.& Z.) Endl.
Japan. Frøplanter fra FH.U.51.
Eksemplaret nærmest svinget det.JL.
- B *Chamaecyparis pisifera* var. *nana* Beiss. Stor aflægger
fra FH.P.10 pl.1948.
- B *Chamaecyparis pisifera* (S.& Z.) Endl. Japan. Frø fra FH.
Pl.1944.
- B *Abies Faxoniana* Rehd.& Wils. V-Kina. Rock 14989.
Pl.1948.

- B *Juniperus virginiana* var. *nana* Ca.1890.
 Stærkt tilbageslag (hele toppen).
- B *Larix Gmelini* var. *olgensis* (Henry) Ostenf. & Syrach
 Korea, Ø-Manchuriet. Frø fra Zehngraft i Korea 357-
 1950. Pl.1954.
- B 101 *Cotoneaster divaricata* Rehd. & Wils. C- og V-Kina.
 Det.JL.51.
- B *Picea Omorika* (Pančić) Purkyně SØ-Europa. Frø fra FH.
 Pl.ca.1920.
- B *Juglans Sieboldiana* Maxim. Japan. Selvsået plante fra
 FH.A.14. Det.JL.51.
- B 102 *Cotoneaster lucida* Schlecht. Altai bjergene (Mong.).
 Det.JL.51.
- B 103 *Cotoneaster integerrima* Med. Europa, N-Asien. Rød
 Dværgmispel. Det.JL.51.

Gruppe C

- C *Larix Gmelini* var. *japonica* (Reg.) Pilger. Kurilerlærk.
Sachalin, Kurilerne. Podning af FH.C.220 1952.
Pl.1954.
- C 2 *Picea jezoensis* (S.& Z.) Carr. N-Japan, Manchuriet. 1890.
Det.KG.38 (typisk) og JL.51.
- C *Abies Veitchii* Lindl. C-Japan. Sået 1919 fra FH.K.14.
Det.JL.51. (Toppen skåret af de to træer.)
- C *Abies firma* Sieb.& Zucc. Japan. Brostrøms planteskole.
Pl.1948. Det.JL.51.
- C 6 *Cornus racemosa* Lam. Nord-Amerika. Det.JL.51. (Gl.plante.)
- C *Larix Gmelini* (Rupr.) Litvin. Østsibirisk Lærk.
Podning 1952 af FH.H.47 pl.1954.
- C 8 *Cornus mas* var. *flava* West. Det.JL.54 (sub.nom. *C.mas* L.).
(Gl.træ nord for C.7.)
- C 7 *Cornus mas* L. Kirsebærkornel. C- og S-Europa, V-Asien.
Det.JL.54 (sub.nom. var.*flava*).
- C *Helwingia japonica* (Thunb.) F.G.Dietr. Kina. Japan. ♂
Det.JL.51.
- C 9 *Cornus Bretschneideri* L.Henry N-Kina. 1931. Det.JL.49.
- C 10 *Cornus sanguinea* L. Rød Kornel. Europa. Det.JL.51.
- C 11² *Larix Gmelini* (?). (Nordligste Lærk ved hegnet.)
SL: Må vist være en selvbestøvet plante fra det opr.
træ FH.B.40. Den skulle således være helsøster til
træ 5 (V.28) i Møllevangen og ligesom den opstået ved
selvbestøvning (sml.Lbh.s årsskr.1937 p.166 og fig.22).
- C 11¹ *Larix leptolepis* x *decidua*. (Sydl.Lærk v.hegnet.) Sået 1926
eft.fri bestøvning af FH.B.23. Det bedste eksemplar af
en lille gruppe, hvorefter de øvrige - også pæne, men ret
langsomt voksende - er fjernede 1939-40.
For undersøgelse blev træet (også kaldet C.11, podet
som V.255) selvbestøvet i 1937. Såningen herfra, S.280
har ved gentagne iagttagelser vist en udspaltning ty-
dende på, at modertræet er af hybrid natur.

- C *Picea Omorika* (Pan.) Purk. Serbisk Gran. Pl.1940.
 Flere planter langs hegnet mell. C.11¹ og C.40.
- C *Cornus* sp. Muchalat Lake, Vancouver Isl., B.C. Sået 1947.
 (555-46)
- C *Berberis stenophylla* Lindl. (B.Darwinii x empetrifolia).
 Syd-Amerika. Skåret stærkt ned efter vinterne 1939/42
 Det.JL.51.
- C 11 *Pinus tabulaeformis* Carr. N- til V-Kina. Rock 13449.
 Pl.ca.1925. Det.
- C *Malus purpurea* var. *Eleyi* (Bean) Rehd. Det.
- C *Cornus sanguinea* L. Rød Kornel, Europa. Det..
- C *Fraxinus chinensis* Roxb. Kina. Det.
- C 15 *Cornus florida* L. Blomsterkornel (Flowering Dogwood).
 Østlige Nord-Amerika. (Rodslående grene.) Det.
- C *Malus pumila* x *baccata*. Det.JL.51: Ant.dette, synes uden
 større værdi. Sub.nom. *M.arnoldiana* Sarg.
- C *Malus baccata* (L.) Borkh. NØ-Asien til N-Kina. Det.
 Sub.nom. *M.zumi* var.*calocarpa* Rehd.
- C *Cotoneaster Dielsiana* Pritz. C- og V-Kina. Bot.Have 319-
 1936. Pl.1944. Det.
- C 16 *Cornus Kousa* Hance Japan, Korea (Koreakornel). 1927,
 frø fra planteskole i Japan ved prof.A.Pedersen.
 Det.KG.45 og JL.51.
 Noget forsk. i blomst og frugt fra C.17 (Svøbbladene
 større og mere plane end hos C.17 - og med stærkt røde
 spidser). Blomstrede i 1954 rigere end nogensinde før
 fra ca.1.juni til 20.juli (farvefotos).
- C *Cotoneaster horizontalis* Decne. V-Kina. Det.
- C *Picea Omorika* (Pan.) Purk. SØ-Europa. Fra ca.1919. Det.
- C 17 *Cornus Kousa* Hance Koreakornel. Det.KG.45 og JL.51.
 Ikke så smuk som C.17 (jfr.denne).
 SL.15/6-47: Planten næsten udgået efter sidste strenge
 vinter. 1954: I fuld blomst.

- C 95 *Quercus Turneri* (*Q. Robur* x *Ilex* ?) var. *pseudoturneri* Henry
(*Q. austriaca* v. *sempervirens* hort.) 1892. Det. KG.39
og JL.51
- C 108 *Fagus sylvatica* var. *pendula* Loud. Hængebøg. 1890 fra
Muskau i Schlesien. Det.
- C *Quercus palustris* Muenchh. Nord-Amerika (østl. USA.)
Fra Hesse, pl. 1954. (Ved hegn.)
- C *Abies balsamea* (L.) Mill. Nord-Amerika. Podning V.509-40
fra Knuthenborg. Pl. 1943. Det.
- C *Pinus radiata* Don. S-Californien. Indsamlet af Placer-
ville 2700 f.o.h. S.1234-1947. Det.
- C *Ribes alpinum* L. ♀ Fjelddribs. Europa. Det.
- C *Thuja plicata* Lamb. NV-Nord-Amerika. Stikl. 1939 af
FH.C.348, pl. 1943. Det.
- C 123 *Juniperus virginiana* L. Nord-Amerika. 1864. Det.
- C 125 *Larix Gmelini* var. *olgensis* (Henry) Ostenf. & Syrach (*Larix*
koreensis Rafn). Korea, Ø-Manch. Rafn 1915.
- C 126 *Larix Gmelini* var. *olgensis* (Henry) Ostenf. & Syrach (*Larix*
koreensis Rafn). Korea, Ø-Manch. Rafn 1915.
- C 130 *Abies Lowiana* x *A. grandis* (*grandis* type). S.00-1925 efter
krydsning mell. de nu faldne træer C.162 og 163. Flyt-
tet fra gruppe R ca. 1934. Det.
- C *Stranvaesia Davidiana* Dene. V-Kina.
Pl. 1954.
- C 137 *Picea Abies* var. *pygmaea* (Loud.) Rehd. 1891. Det. JL.51
(sub.nom. var. *pygmaea-globosa*).
- C 138 *Chamaecyparis nootkatensis* (Lamb.) Spach NV-Nord-Amerika.
1864. Det.
Rosa canina L. Hunderose vokser op i C.138.
- C 139 *Picea Abies* var. *Remontii* (R. Smith) Rehd. 1891. Det.

- C 140 *Taxus baccata* var. *stricta* Laws. (*T.B.v.fastigiata* Loud.).
1864. Det.
9/6-42: Kun lidt svedet. Jan.54: Skåret stærkt tilb.
- C 141 *Juniperus chinensis* L. ó Kina, Mong., Japan. 1864. Det.
- C *Castanea sativa* Mill. Ægte Kastanje. Podning af det gamle
træ i Krogerup park (sået 1699, faldt eft.de strenge
vintre 1939/42 og -47). Pl.1954.
- C 152 *Picea sitchensis* (Bong.) Carr. Alaska-Californien. 1864.
Det. Formentlig Danmarks ældste Sitkagran.
- C *Pinus contorta* Loud.
- C *Crataegus flabellata* (Spach) Kirchn. Østl.Canada. Frø fra
FH.D.59. Pl.1946.
- C *Buxus sempervirens* var. *bullata* Kirchn. Stikl.fra FH.
Pl.1953.
- C *Quercus borealis* var. *maxima* Ashe. Østl.Nord-Amerika.
Frø fra de gamle Rødege i Schäffers plsk. i Hørsholm
1948. Pl.1954.
- C 163 *Quercus imbricaria* Michx. Laurbæreg, Østl.Nord-Amerika.
Hesse 1941. Flyttet fra D 1954.
(Tidl. C.163, *Abies grandis*, faldt i storm febr.1953.)
- C *Abies procera* Rehd. (*A.nobilis* Lindl.). Vestl. Nord-Amerika
Frø fra Frijsenborg. Pl.1944. Det.
- C *Picea rubens* Sarg. (*P.rubra* (Dur.) Link). Østl.Nord-Amerika
Frøplante fra Egelund. Pl.ca.1943. Det.
- C 175 *Carya cordiformis* (Wangh.) K.Koch var. (*C.amara* Nutt. var.).
Arten (syn. *Hicoria c.* Brit.) fra østl.Nord-Amerika.
Det.KG.41, men ikke taget stilling til varieteten.
- C 176 *Carya ovalis* (Wangh.) Sarg. (*Hicoria microcarpa* Brit.).
Østl. Nord-Amerika. 1851 (sub.nom.*C.glabra*).
Det.KG.41: Snarare *C.ovata*, men frugten ligner *C.lacini-
nosa*.
Det.JL.51: Er *C.ovalis*, dog vist ikke helt typisk.
- C 178 *Juglans* - hybrid (bedste plante ved hegnet). Frø fra FH.
C.168 (*J.cinerea*, skovet 1925). Det.JL.51: Er en kryd

- C 190 *Juglans cinerea* L. Nord-Amerika. Frø fra FH.D.168 (jfr. C.178 foran). Det.JL.51 (synes rigtig).
- C 191 *Carya tomentosa* (Lam.) Nutt. (*C.alba* K.Koch). Nord-Amerika. 1851. Det.KG.41: Vistnok ikke C.t., snarere *C.ovata*. Det.JL.49: Er sikkert C.t., dog er stammebarken på ældste del af stammen lovligt afskrællende, ligesom hasen kløver helt til grunden. Ofte kun fem småblade.
- C 193 *Pterocarya fraxinifolia* (Lam.) Spach Kaukasus, Persien. 1851. Det. (Livlig formering ved rodsud.)
- C 194 *Fagus grandifolia* Ehrh. Nord-Amerika. Rafn 1909.
- C 195 *Aesculus neglecta* var. el.krydsning. Rafn 1906 (sub.nom. *A.glabra* Willd.)
Det.KG.44: *A.octandra* var.*virginica* Sarg., men blomsten er for kort. Det.JL.51: Er snarere *A.neglecta* v. eller *A.octandra* x *neglecta*.
- o--
- C 206 *Tilia platyphyllos* Scop. Storbladet Lind, Europa. Det.
- C 207 *Pinus Cembra* L. Europ.bjerge, N-Asien. Det.
- C *Ilex Aquifolium* L. Kristtorn. Står i hegnet.
Stiklinger herfra bærer tidligt bær.
- C 209 *Rhamnus caroliniana* Walt. Nord-Amerika. Det.JL.51: Ikke helt typisk, blomsterstande uden fællestilk.
- C *Rhamnus cathartica* L. Korsved, Vrietorn. Europa.
Bot.Have 1918. Det.
- C 210 *Fagus orientalis* Lipsky Orientalisk Bøg. Podning V.437-1939 fra Oreby skovdistrikt, Storskoven afd.158. Det.
- C *Buxus sempervirens* var. *albo-marginata*. V.115-1937. Det.
(Ved bæk.)
- C *Viburnum Carlesii* Hemsl. Korea.
- C *Kolkwitzia amabilis* Graebn. C-Kina. Frø fra Morton Arboret, Illinois. Flyttet fra gruppe T (fig.8 i Lustgården 1947/48) 1949. Det.

- C *Juniperus squamata* var. *Meyeri* Rehd. Stikl.1942, pl.1949.
Det.
- C *Buxus sempervirens* var. *aureo-marginata*. Stikl.V.101-1937
fra FH.C.321² pl.1949. Det.
- C *Buxus sempervirens* var. *aureo-variegata* West. Pl.1949. Det.
- C *Buxus sempervirens* var. (*decussata*). Pl.1949.
- C 219 *Larix Gmelini* var. *japonica* (Reg.) Pilger. (*L.kurilensis*
Mayr.) Sachalin, Kurilerne. Rafn 1915 (sub.nom.
L.dahurica).
- C 220 *Larix Gmelini* var. *japonica* (Reg.) Pilger. Kurilerlærk.
Rafn 1915.
- C 221 *Thuja occidentalis* var. *lutea* Kent 1890. Det.
- C 222 *Juniperus virginiana* var. *fastigiata* hort. 1864. Det.
9/6-42: Stærkt svedet.
- C 223 *Sorbus alnifolia* (Sieb.& Zucc.) K.Koch Kina, Korea, Japan
Frø 1921 fra Antong gen. C.H.Ostenfeld.
Det.KG.44 og JL.51.
9/6-42: Helt ubeskadiget, smuk i blomst.
Jan.55: Dekorative frugtstande (minder om *Malus floribunda*),
hvoraf der endnu sidder nogle tilbage.
- C 224 *Thuja occidentalis* var. *Bodmeri* Beiss. 1891. Det.
- C 228 *Pinus nigra* var. *austriaca* (Hoess) Asch.& Gr. Østrig til
Balkan. 1864. Det.JL.51.
- C *Thuja occidentalis* L. Østl. Nord-Amerika. Fra Dronning-
gård, pl.1943.
- C *Picea sitchensis* x *glauca*. S.158-1934: Tidl.FH.K.34 x
Hvidgran i løbælte i Egelund. Pl.1943, 4 stk: 800
Det.JL.54: Alle fire intermediære mellem →N
forlædrene. Den næstnordligste er den mest sitkaagtige
i vækst, grenlængde og nålekarakterer (flade nåle,
ofte brudte spalteaåbningsstriber. De to sydligste mest
glauca agtige (nåle rhombiske i tværsnit, færre brudte
spalteaåbningsstriber).

- C 230 *Pinus nigra* var. *austriaca* (Hoess) Asch.& Gr. (P.Laricio var.a. Loud.) Østrigsk Fyr. Måske J.F.Hansens frø fra 1838 (se Lbh.s årsskr.1925 p.39). Pl.1864 el.tidl. Det.JL.51(sub.nom. P.n.var.calabrica). Står i hegnet.
- C *Picea glauca* (Moench) Voss. Nord-Amerika. S.162-1934: Fri bestøvning af Hvidgran i løbælte i Egelund, jfr. omkringstående krydsninger. Pl.1943, 3 stk. Det.JL.54: Alle tre planter typiske P.g.. Blå trods ret dyb skygge. Koglen ikke helt norm.udviklet, men ellers typisk.
- C 237 *Thuja plicata* Lamb. (T.gigantea Nutt.) Vestl.Nord-Amerika 1864. Det. 9/6-42: Stærkt svedet. Står v.gangen.
- C 238 *Juniperus chinensis* var. *pyramidalis* (Carr.) Beiss. ♀ Det.JL.51 (sub.nom. var.stricta).
- C *Thuja occidentalis* var. *pulcherrima* hort. Stikl.fra FH. C.364 pl.1951.
- C *Pinus Mugo* Turra Indsamlet af E.Oksbjerg i Münstertal, Schweiz, 1600 m.o.h. S.1772-1950, pl.1954. "Flerstammet".
- C *Spirea Henryi* Hemsl. C- og V-Kina. AO.1951. Det.JL.54: Ej sikker.
- C 241 *Picea sitchensis* (Bong.) Carr. Sitkagran, Alaska til Calif S.285-1938: Boller skovdistrikt. Pl.1944, 3 stk.
- C 242 *Picea jezoensis* var.*hondoensis* x *P.glauca* S.67-1932: FH.B.66 x Hvidgran i løbælte i Egelund. Pl.1943, 1 stk Det.JL.54: Ligner ikke I.10 (samme krydsning) ret meget nærmer sig P.jez. både i vækstform og knopkarakterer (blank, jævn, læderbrun). Nåle flade (overalt-P.jez.), vist alle med brudte spalteaåbningsstriber, derfor svagt blå på oversiden (*glauca*), spidse men ikke stikkende. Nålepuder ret svuldnede. Grenene ret korte, omtr.som hos *glauca*. Coolei-galle.
- C *Abies cephalonica* Loud. Grækenland. Podning V.512-1940 fra Knuthenborg. Pl.1951.
- C 243 *Picea Engelmanni* x *glauca*. S.157-1934: FH.K.51(er en var. *glauca*) x Hvidgran i løbælte i Egelund. Pl.1943 i K, flyttet hertil 1947. 1 stk. Det.JL.54: Skud svagt kirtelhårede. Nåle ret bløde, ikke stikkende, dog ret udstående (90°) som hos *glauca*. Ligner iøvrigt noget en grovnålet *glauca*. Coolei-galle.

- C *Pinus Cembra* L. Europ.bjerge, N-Asien. Vejle Amts Plsk. Pl.1951.
- C *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. (*Q.sessiliflora* Salisb.). S.1410-1948, afkom af Vinteræg på Løvenholm. Pl.1954.
- C *Buxus sempervirens* var. *arborescens* L. Stikl.V.118-1937. Pl.1951 og -53. Flere planter langs hegnet fra C.207 til C.264.
- C 250 *Thuja plicata* Lamb. Vestl.Nord-Amerika. 1890. Det. 9/6-42: Stærkt svedet.
- C 252 *Thuja orientalis* L. (*Biota o.* Endl.) Kina. Korea. Det.
- C 254 *Thuja plicata* var. *gracillima*. 1892. Noget tilbageslag forneden på træet. Det. 9/6-42: Lidt svedet. Tilbageslaget har lidt mest, selvom det sidder lavest og mest beskyttet.
- C 256 *Juniperus chinensis* L. Kina, Mongoliet, Japan. ♂ Det.
- C *Spirea trichocarpa* Nakai Korea. AO.1951. Det.
- C *Spirea nipponica* Maxim. Hilliers type. AO.1951. Det.JL.54.
- C *Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd. Kina, Assam. Frø 1947 fra Arnold Arboret. Pl.1954. Toppen brækket dec.1954
- C *Spirea x Billiardii* Herincq. AO.1951 (sub.nom. *S.triumphans* hort.). Det.JL.51.
- C *Ilex Aquifolium* var. *ferox* Ait. AO.1929. Det.
- C *Spirea Henryi* var. *magnifica* hort. AO.1951. Det.JL.51: *S.Henryi* Hemsl.
- C *Malus floribunda* Sieb. (?) Podning 1949 af et smukt blomstreksemplar i Arboretet (L², 78 V). Dette træ er frøplanter fra FH.1937. Det.KG.40: Er muligvis *M.f.*, men bør ses i blomst.
- C *Spirea x Vanhouttei* (Briot.) Zab. (*S.cantonensis* x *trilobata*) AO.1951. Det.
- C 261 *Larix leptolepis* (S.& Z.) Gord. Japansk Lærk. 1889. Det.

- C *Picea Engelmanni* var. *glauca* ant. x. *P.sitchensis*.
Frøplanter fra PH.K.51 sået 1919. 1954: 4 stk.
Det.JL.54: Synes intermediære i mange karakterer:
De to nordligste og højeste: Skud sv.kirtelhårede,
vækst sitka-agtig, stammebark endnu jævn. Nåle ikke
egl.stikkende, mere fremadrettede end Sitkas, flade m.
brudte spalteaåbningslinier på oversiden. Kogler af sit-
kastørrelse og -type.
De to sydligste og laveste: Står mere skygget. De la-
vere siddende skud har derfor smallere, næsten sammen-
trykte nåle. Lysstillede nåle derimod flade. Det syd-
ligste svagest voks.træ har kortere nåle, der måske
kan minde lidt om *glauca* (uden kogler). Det andet træ
har små, sitkalignende kogler.
- C *Malus* sp. Gold River, Vancouver Isl., B.C. Indsamlet 1946
af SL. Pl.1954.
- C *Malus sikkimensis* (Hook.f.) Koehne Himalaya. Frø 1949,
ant. fra Kina. Pl.1954.
- C 264 *Pinus nigra* var. *austriaca* (Hoess) Asch.& Gr. Østrigsk Fyr.
Pl.1864 el.tidl.(jfr.C.230). Står i hegnet.
Det.KG.40 (kogle ej set) og JL.51.
- C 271 *Euonymus europaea* L. Alm.Benved, Europa til V-Asien. Det.
SL. Særlig smuk og rig i frugt. Står ved gangen.
- C 272 *Juniperus Sabina* L. Alperne til Kaukasus og Sibirien. Det.
- C 273 *Thuja plicata* Lamb.(*T.gigantea* Nutt.) V-Nord-Amr. 1864. Det
9/6-42: Stærkt svedet.
- C 276 *Pinus nigra* var. *austriaca* (Hoess) Asch.& Gr. Østrig til
Balkan. Pl.1864 el.tidl.(jfr.C.230).
Det.KG.40 (koglen ikke set) og JL.51.
- C *Castanea sativa* Mill. Ægte Kastanje, Middelhavslandene.
Podning 1951 fra Bækkeskov Dyrehave (rigest og bedst
fruktificerende træ). Pl.1954.
- C *Abies Veitchii* Lindl. C-Japan. Ca.1920. Det.
- C *Betula pubescens* Ehrh. Dunbirk = Hvidbirk. Podning V.402-
1939 fra træet H.10.8 i Maglemose, Grib Skov (Bot.tids-
skr.1925, 39.b., 2.h., fig.6 og 11). En sikker Hvidbirk.
Pl.1943. Det.
- C 282 *Populus canescens* (Ait.) Sm. Gråpoppel, Stenderup skovd.
Stikl.V.567-1943, pl.1944. Det.

- C 286 *Taxus baccata* L. ♀ Europa, N-Afrika, V-Asien. Gl.træ.
Det. 9/6-42: Lidt svedet i toppen ligesom C.287.
- C 287 *Taxus baccata* L. ♂ Gl.træ. Det.
- C 288 *Populus tremuloides* Michx. ♀ Nord--Amerika. Rodstikl.1941
fra Knuthenborg park, pl.1944. Det.
Mistelten (*Viscum album* L.) fra Knuthenborg sået 1950.
- C *Betula Maximowicziana* Reg. Japan. Frø 62-1950 fra Arnold
Arboret. Pl.1954.
- C 290 *Crataegus monogyna* Jacq. Engriflet Hvidtjørn, Europa,
N-Afrika, V-Asien. Gl.træ. Det.JL.51 (typisk).
- C *Buxus sempervirens aureo-variegata* West. (Omkr.C.290.)
- C *Buxus sempervirens* L. S-Europa, N-Afrika, V-Asien.
Stikl.V.100-1937. Pl.1953.
- C *Buxus sempervirens* var. *bullata* Kirchn. Pl.1953.
- C 291 *Prunus insititia* var. *syriaca* Kochne Mirabel. Ant. frø
fra Lilleasien ved Rafn. (Sydligst på skråningen mod
jernbanen.)
- C *Larix Gmelini* (Rupr.) Litvin. (*L.dahurica* Turcz.)
Øst-Sibirien. Rafn 1915.
- C *Populus tremuloides* x *tremula*. Knuthenborg x vildtvoksende
træ i Arboretet (parcel 18/m). S.2043-1951, pl.1953.
- C 295 *Betula* sp. (*B.pubescens* ?)
- C *Populus canescens* (Ait.) Sm. Gråpoppel, Stenderup skovd.
Stikl.1943, pl.1944. (V.567-1943)
- C *Betula pendula* Roth. (*B.verrucosa* Ehrh.) Vortebirk fra
Hohenlüblichow i Holsten. Frø indsamlet af et godt træ
af udpræget pendula-type i en ganske påfaldende ren
bevoksning (plantning) af denne art. S.260-1938.
Pl.1943.
- flg.7 pl. SØ for stien --
- C 298 *Betula Ermani* Cham. NØ-Asien, Japan. Frø fra Hokkaido
(Kucchan distr.) 480 m.o.h. (624-1950). Pl.1954.

- C *Malus toringoides* (Rehd.) Huges V-Kina. Frø 1950 fra
Arnold Arboret. Pl.1954.
- C *Viburnum fragrans* Bge. Kejserbusk, N-Kina. Brostrøms plsk.
Pl.ca.1945.
- C 300 *Taxus baccata* L. Europa, N-Afrika, V-Asien. 1890. Det.
- C *Sambucus nigra* x *racemosa*. Stikl.V.614-1943 af spontan
krydsning fra Gammelmosen nord for København.
- C *Sambucus nigra* var. *laciniata* L. Fligetbladet Hyld.
- C *Viburnum trilobum* Marsh. Nord-Amerika. Det.
- Flg. v.for stien og nær Baghaven ---
 Buske fra tidl. gruppe Ca og Cb findes her.
- C *Lonicera tatarica* var. *rubriflora* DC. Det. (Tidl.Ca 3)
- C *Euonymus europaea* L. Benved. Europa - V-Asien.
- C *Lonicera coerulea* L. N-Europa og Asien. Det. (Ca 19)
- C *Betula mandshurica* var. *japonica* (Miq.) Rehd. Frø 620-1950
fra Iwate, Moricka distr. i Japan. Pl.1954.
- C *Castanea sativa* Mill. Ægte Kastanje fra Horbelev præstegd.
Podning 1951 af det store, godt og rigt fruktific.træ.
Pl.1954.
- C *Viburnum Lentago* L. Nord-Amerika. Det.
- C 302 *Alnus incana* (L.) Moench Hvidel, Europa, Kaukasus, N-Amr.
Frø 1927 fra tidl.FH.C.322. Det.
- C *Lonicera tatarica* -krydsning (sub.nom. *L.chrysantha* Turcz.)
Det. (Tidl.Ca 5)
- C *Lonicera tatarica* var. *elegans* Carr. Det.
 (Ca 11)
- C 304 *Larix decidua* Mill. Europæisk Lærk. 1890. Det.
- C *Lonicera tatarica*-form (sub.nom. *L.orientalis* var.*caucasia*
Zab.). Det. (Ca 9)

~~Bul~~ *a pubescens* Ehrh. Dunbirk el. Hvidbirk, Europa og Sibirien. Det.

~~Des~~ *alpinum* L. Fjeldribs.

~~Les~~ *ia monticola* (Rehd.) Sarg. Snekløkketræ, Sydøstl. USA. Frø 1916 fra FH. Det. JL. 51 (i overensstem. med KG.). (Tidl. Cb 2)

~~pus~~ *phoenicolasius* Maxim. Vinbrombær, Korea, Japan og N-Kina. Det. Vokser på skråningen.

~~tin~~ *idia Kolomikta* (Rupr.) Maxim. Kamæleonbusk, NØ-Asien til Japan. ♀ 1891. Det. (Cb 7)

~~ae~~ *agnus multiflora* Thunb. Kina, Japan. Det. (Cb 4)

~~sa~~ *Moyesii* Hemsl. & Wils. V-Kina. Det.

~~gl~~ *ans regia* L. Alm. Valnød, SØ-Europa - Himalaya - Kina. Det. JL. 54.

~~pul~~ *us vernirubens* Henry (P. angulata x ?). "Henry's Poppel". Stikl. skåret nov. 1928 hos prof. A. Henry i Dublin (nomen nudum P. erecta v. pyramidalis). Litt.: Gardeners Chronicle 1930 p. 24-25, 2 fig., Dansk Skovforen. Tidssk. 1936 p. 239-41, 1 fig. og Lbh.s årsskr. 1937 p. 149-52. Siden 1936 er der foretaget ugentlige omfangsmålinger i vækstperioden. Jan. 1955 er omf. i brh. 241 cm (sv. til en diam. på 76½ cm) og højden 27,8 m. Dette giver en gnstl. årlig tilvækst på 9,3 cm omfang (2,9 cm diam.) og 107 cm højde. NB: Står meget gunstigt i "Baghaven".

~~pul~~ *us lasiocarpa* Oliv. Kina. Pl. 1929. Det. KG. 45 og JL. 51. Tvekønnet (årlig rigt frøbærende, om hanblomstr. er noteret 26/5-41: ♂ - 15/5-47: Stærkt fald af rene hanrakler).

~~-cl~~ *amen* 18/8-45: Frø modent samt m. at første ny blomster sprud.

~~-is~~ *tolochia durior* Hill. Tobakspibeplante, Østl. USA. Det.

~~anis~~ *permum clauricum* DC. Månefrø. Østasien. Det. JL. 51. (Slyng. busk, nærmest urteagtig, fryser årlig ned.)

~~Ln~~ *us incana* (L.) Moench Hvidel, Europa, Nord-Amerika. Det.

- C Ribes alpinum L. Fjeldribs, Europa. Det.
- C Symphoricarpos rivularis Suksd. (S."albus"). Alm.Snebær.
Nord-Amerika. Det. (Ca 34)
- C Lonicera coerula L. Nordl.Europa og Asien. Det. (Ca 33)
- C Viburnum Lantana L. Pibe-Kvalkvæd. Europa, V-Asien. Det.
(Ca 31) Står lige vest for C.311.
- Flg.planter Ø.for stien --
til Baghaven.
- C Lonicera Xylosteum L. Dunet Gedeblad. Europa - Altai.
Det. (Ca 36)
- C Populus koreana Rehd. Vårpoppel, Korea. Stikl.ca.1949 fra
Arboretet. Det.JL.54.
- C Betula lutea Michx. Nord-Amerika (østlige). Frø 169-1950
fra Milford, New Hampshire. Pl.1954.
- C 311 Betula pubescens Ehrh. Hvidbirk. Europa, Sibirien. 1890.
Det.
- C 318 Betula pendula Roth. (B.verrucosa Ehrh.) Vortebirk.
Europa, Lilleasien. 1890. Det.
SL.40: Særlig smukt træ med udpr. glat og hvid bark.
- C Lonicera Xylosteum L. Dunet Gedeblad. (Tidl.C.316)
- C 317 Prunus serrulata Lindl. Japan, Kina. AO.1929 (sub.nom.
P.Maximowiczii Rupr.). Det.JL.51.
- C 319 Populus canadensis var. regenerata (Schneid.) Rehd. ♀
1885 (sub.nom. P.balsamifera L.). Det.KG.45 og JL.51.
- C 320 Taxus baccata L. Selvsæt.
- C Alnus viridis DC. Europas bjerge. Det. (Ved egebænken.)
- C 321¹ Buxus sempervirens var. rosmarinifolia (Madiot) Baill.
Ca.1890.
- C Hamamelis intermedia Rehd. (H.mollis x japonica).
Spontane krydsninger fra FH.U.47. Sæt 1934, pl.1944
i gr.T, flyttet hertil 1948. Det.

- C *Betula lutea* Michx. Østl.Nord-Amerika. Rafn 1935.
Pl.1944. Det.
- C *Malus sikkimensis* (Hook.f.) Koehne Himalaya. Frø 595-
1950 fra Arnold: 3n, apomiktisk, halv dværgagtig.
Pl.1954.
- C *Betula nigra* L. Sortbirk, østl.Nord-Amerika. Kviste fr.AO
Podning V.1283-1948, pl.1954.
- C *Buxus sempervirens* var. *aureo-variegata* West. Stikl.1937
af den gl.Buksbom C.321². Det.
- C 321⁵ *Buxus sempervirens* L. 1890, Hørsholm (sub.nom. var. *decus-
sata*). Det.JL.51.
9/6-42: Synes død, helt vissen. Skåret ned 1943
- C *Buxus sempervirens* var. *bullata* Kirchn. Stikl.1937 fra FH.
- C *Taxus baccata* var. *lutea* Endl. Stikl.fra FH.B.50. Pl.1949.
- C *Malus Sargentii* Rehd.
Frø 598-1950 fra Arnold Arboret, pl.1954.
- C 323 *Populus tremuloides* var. *vancouveriana* (Trel.) Sarg.
Frø samlet 1946 ved Vancouver by af SL. Sået 1946 på
Hellestrup (sv.til vort nr.S.991), pl.i FH. febr.1948
som 15 cm høje planter fra urtepotte. Det.
- C *Juniperus communis* L. Ene af dansk avl. Det.
- C *Juniperus Sabina* L. Sevenbom. Alperne - Kaukasus og Sibir
Gl.plante. Det.
- C 324 *Pinus nigra* var. *austriaca* (Hoess) Asch.& Gr. Østrigsk Fyr
Pl.ca.1890. Det.KG.40 og JL.51.
- 00--
- C 326 *Populus tremula* L. ♂ Bævreasp, Europa (og Sibirien).
(Står nær Baghaven, øst for stien.)
- C *Viburnum tomentosum* Thunb. Japan, Kina. Fra Hesse. Det.
(Ca 38)
- C 327 *Pinus Peuce* Griseb. Balkans bjerge. Frø 1904 fra FH.C.117
skovet 1924 (Lbh.s årsskr.1925 p.36). Det.

- C 329 *Prunus Ssiori* F.Schmidt Japansk Hæg, NØ-Asien, Japan.
Rafn 1914. Det. Rød i udspring.
- C 330 *Prunus Ssiori* F.Schmidt Rafn 1914. Det. Grøn i udspring.
- C 331 *Prunus Ssiori* F.Schmidt Rafn 1914. Det. Svagt rød i udsp.
SL.3/4-49: Sant.m.de allerførste anemoner så jeg træet
i tydeligt løvspring: Knopperne ved at udfolde sig og
de unge blade indtil 5 cm lange. Blomsterkn.ses tydel.
- C 332 *Sorbus alnifolia* (S.& Z.) K.Koch Kina, Korea, Japan.
Frø 1921 fra Antong gen. C.H.Ostenfeld (jfr.C.223).
Det.KG.44 og JL.51.
- C 333 *Pinus sylvestris* L. Skovfyr, Europa til Sibirien.
Ca.1890. Det.
- C 334 *Betula pubescens* Ehrh. Hvidbirk med heksekoste. Det.
- C 335 *Juniperus chinensis* L. ♀ Kinesisk Ene, pl.ca.1890. Det.
- C 337 *Pinus nigra* var. *austriaca* (Hoess) Asch.& Gr. Østrig til
Balkan. 1890. Det.
- C 338 *Pinus Jeffreyi* A.Murr. Oregon til Californien. Rafn 1908
(sub.nom. *P.ponderosa* var. *scopulorum* Engelm.). Det.
- C *Alnus cordata* Desf. Hjertebladet El, Italien, Korsika. Det.
- C 339 *Picea jezoensis* var. *hondoensis* (Mayr) Rehd. Central-Japan.
Rafn 1906.
- C 340 *Larix Gmelini* var. *olgensis* (Henry) Ostenf.& Syrach (*Larix*
olgensis Henry, *L.koreensis* Rafn). Korea, Ø-Manchur.
Rafn 1915. SL: Rød hun. Det.JL.51
- C 341 *Larix Gmelini* var. *olgensis* (Henry) Ostenf.& Syrach
Rafn 1915. SL: Gul hun. Det.JL.51
- C *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa* (Carr.) Otto
- C 344 *Picea Glehnii* (Fr.Schmidt) Mast. Sachalin, Japan.
Rafn 1908. Det.KG.43: Efter kviste god, men ikke
helt tilfredsstillende kogler. Måske *P.xnotha* Rehd.
(*P.jezoensis* v.*hondoensis* x *P.Glehnii*) vel affinis.
Det.JL.49.

- C 345 *Abies numidica* Carr. Nord-Afrika. Fåborg plsk.1912 (2/0).
Det.JL.51. Meget medtaget efter de strenge vintre
1939-42, men skyder friske skud juni 42. Juli 1942:
Døende. April 43: Fodekviste til Hørsholm. Jan.1955:
Meget svag krone. De fire podninger i Arboretet er 1-
1½ m høje og ved at danne top-skud (det.JL.52: nærmer
sig A.Pinsapo). Podningerne er meget sunde.
- C *Alnus cordata* Desf. Hjertebladet El, Italien, Korsika. Det.
- C 346 *Pinus Cembra* var. *sibirica* Loud. Sibirien. Rafn 1908. Det.
- C 347 *Pinus Peuce* Griseb. Balkans bjerge. Frø 1915 fra FH.H.19.
Det.JL.51: Vel rigtig, ikke helt typisk.
- C 348 *Thuja plicata* Lamb. (*T.gigantea* Nutt.). Vestl.Nord-Amerika.
Frø fra FH.1906. Træet stiklingeformeret under V.335.
9/6-42: Kun ubetydeligt svedet. Det samme gælder to
jævnaledrende nabotræer samt to til øst for *Pinus parv.*
(Må være hårdfør type fra fælles modertræ).
- C *Crataegus erimitagensis* Raunk. Eldre, selvsået Tjørn.
Det.KG.44. (Står i sydl.hegn v.tidl.låge. Opr.C.357.)
Vedr.C.e. se Botanisk Tidsskrift bd.42, p.232-250.
- C 349 *Populus canadensis* var. *marilandica* Rehd. ♀ 1845 (sub.
nom. *P.nigra* L.). Det.KG.45 og JL.51.
- C 351 *Taxus baccata* var. *Dovastonii aurea*. Det.JL.51.
9/6-42: Svedet i toppen. Et andet eksemplar, V.46,
døde efter de strenge vintre.
- C 352 *Pinus sylvestris* L. Skovfyr, Europa, Sibirien. Frø 1910
fra FH. Det.
- C 353 *Thuja occidentalis* var. *lutea* Kent 1890. Det.
- C 354 *Picea Omorika* (Pan.) Purk. Serbisk Gran. Frø 1915 fra FH.
Det.
- C *Picea pungens* Engelm. Nord-Amerika. Det.
- C 355 *Chamaecyparis Lawsoniana* var. *Smithii argentea*. 1890. Det.
9/6-42: Stærkt svedet, men kommer dog måske på største
delen af kronen.
- C *Crataegus splendens* Lodd. (ad *C.prunifolia* Pers. ifl.Bean).
Hesse. Pl.1944.

- C 356 *Taxodium distichum* (L.) Rich. Sumpcypres. Østl.Nord-Amr.
1890. Det. 13/6-42: Ubeskadiget.
- C 362 *Picea glauca* var. *coerulea* (Nels.) Rehd. 1891. Det.
- C 364 *Thuja occidentalis* var. *pulcherrima* hort.
- C *Chamaecyparis thyoides* var. *ericoides* (Carr.) Sudw.
Stikl. 532-1948 fra Knuthenborgs "ukendte retinispore".
Pl.1954. Det.JL.54.
- C 365 *Thuja occidentalis* var. *globosa* Gord. (T.o.v.Froebeli hort.)
Stikl.V.182 fra FH.H.15. Pl.1942. Det.
- C *Thuja occidentalis* var. *fastigiata* Jaeg. Stikl.V.180 fra
FH.H.4.
- C *Pinus parviflora* Sieb.& Zucc. Japan. Selvsæt ca.1942 fra
C.368. Det.JL.51.
- C *Abies lasiocarpa* var. *arizonica* (Merr.) Lemm. Arizona,
New Mexico. Pl.1954. Muligvis frø fra Arizona via
Vejle Amts Plsk. som små planter f.1941 til Arboretet.
- C 368 *Pinus parviflora* Sieb.& Zucc. Japan. 1889. Det.
- C *Hamamelis intermedia* Rehd. (H.mollis x japonica). Spontane
krydsninger fra FH.U.47 pl.1954.
- C *Chamaecyparis pisifera* var. *filifera aurea* Beiss. Pl.1954.
Det.JL.
- C *Viburnum tomentosum* Thunb. Japan, Kina. Flyttet fra A.5.
Det.JL.54.
- C *Chamaecyparis obtusa* 'Fars søjleform'. Stikl.V.121-1946
pl.1954. En gruppe samt omkring
-- Bænken ved Dreyers --
- C *Thuja occidentalis* var. *pulcherrima* hort. Stikl.V.184-1937
af FH.C.364.
- C *Chamaecyparis nootkatensis* (Lamb.) Spach Alaska til Oregon.
Pl.1954.
- C *Picea Omorika* (Pan.) Purk. SØ-Europa. Frøpl.fra FH.

- C 375 *Picea Abies* var. *nana* (Carr.) Schroet. 1891. Det.
- C *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa aurea* (R.Smith) Otto
Stikl.1937 fra tidl.FH.B.2. Flyttet hertil 1954.
- C *Chamaecyparis thyoides* var. *atrovirens* Knight Stikl.V.138-
1945 fra tidl.FH.P.11. Pl.1954.
- C *Juniperus chinensis* var. *japonica* (Carr.) Lav. Det.JL.54
(sub.nom. var.*japonica aureo-variegata* (Beiss.) Mast.).
- C *Thuja occidentalis* var. *Bodmeri* Beiss. Stikl.V.188 af FH.
C.224. Pl.1942 på Stenhøj, flyttet hertil 1954.
- C *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa* (Carr.) Otto Stikl.
V.132-1937 fra tidl.FH.B.20. Pl.1954.
- C *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa argentea* (Sén.) Otto
Stikl.af FH.B.35. Pl.1954. Det.JL.
- C *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa* (Carr.) Otto Stikl.
V.134-1946. Pl.1954.
- C 382 *Picea Abies* var. *compacta* (Kirchn.) Nash 1891. Det.
- C *Thuja occidentalis* var. *fastigiata* Jaeg. Stikl.V.180 fra
FH.H.4. Pl.1954.
- C *Thuja occidentalis* var. *Ellwangeriana* Beiss. Stikl.V.186-
1937 fra tidl.FH.K.40. Pl.1948.
- C *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa*, ny form. Stikl.1947
af S.226¹, en afvigende plante i såning fra FH.B.47
(*Cham.p.var.squarrosa*). Pl.1954.
- C 387 *Picea Engelmanni* (Parry) Engelm. el.krydsning. Ca.1890.
Det.JL.49: Synes til trods for sine stikkende nåle at
være P.E. eller en krydsning mellem P.sitchensis og
P.E.. Afgørende karakterer: Korthårede skud, stamme-
bark afskrællende som hos P.s., kogleskæl blanke.
- C *Celastrus scandens* L. Træmorder, Nord-Amerika. Det.
Slynger sig op ad C.387.

- C *Chamaecyparis obtusa* (S. & Z.) Endl. Frø fra FH. Det.
- C *Crataegus submollis* Sarg. Østl. Nord-Amerika. Hesse.
Pl. 1944.
- C 391 *Alnus cordata* Desf. Italien, Korsika. Ca. 1920 frø fra
FH.C.305. Det.
- C 392 *Forsythia intermedia* Zab. (*F. suspensa* x *viridissima*).
Flyttet hertil fra D.8 1934. Det. JL.51 (sub.nom.
F. suspensa var. *Sieboldii* Zab.).
- C 393 *Taxus baccata* var. *Nedpath Castle* hort. Det.
13/6-42: Meget svedet, særlig toppen, men nederste
grene helt ubeskadigede.
- C 395 *Taxus baccata* var. *Dovastonii* Laws. Det.
13/6-42: Stærkt svedet, særlig toppen.
- C *Sambucus nigra* x *racemosa*. Druehyld x Alm. Hyld. Stikl. 1943
af en spontan krydsning fra Gammelmosen nord for
København (V.614). Pl. 1944.

Gruppe D

- D 1 *Populus Simonii* Carr. N-Kina. ♂
Hesse 1912. Det.KG.45 og JL.51.
- D 5 *Syringa amurensis* Rupr. N-Kina, Manch. Det.
- D *Lycium halimifolium* Mill. Bukketorn. SØ-Europa - V-Asien.
Det. Vokser op i Syrenen D.5.
- D *Fraxinus excelsior* var. *diversifolia* "pendula". Podekvist
272-1950 fra Arnold Arboret. Pl.1954.
- D 22 *Fontanesia phillyreoides* Labill. Det.
- D 21 *Fraxinus excelsior* var. *diversifolia* Ait. S.413-1939 fra
Lilliendal (fri bestøvn.af F.e.var.d.). Pl.1944. Det.
- D 24 *Fontanesia Fortunei* Carr. Kina. 1891. Det.
13/6-42: Stærkt beskadiget, bryder kun hist og her.
Jan.55: Sund, ca.5 m høj og 6 m bred.
- D *Philadelphus californicus* Benth. Californien. Flyttet her-
til fra gr.A 1934. Det. (Tidl.nedskåret.)
- D *Syringa amurensis* Rupr. Amursyren. Det.
- D *Kolkwitzia amabilis* Graebn. C-Kina. Pl.1954.
- D 30 *Quercus Robur* L. Stilkeg, Europa, N-Afrika, V-Asien. Det.
Gl.træ.
-- Bænk --
- D 30² *Tsuga diversifolia* Maxim. Japan. Rafn 1906. Det.
- D 30³ *Staphylea colchica* Stev. Blærenød, Kaukasus. Det.
SL.23/5-49: Smukt blomstrende.
- D 32 *Quercus Robur* L. Stilkeg. Det. Gl.træ.
- D *Euonymus europaeus* L. Alm.Benved. Europa, V-Asien.
Stikl.700-1950 fra FH.C.271. Pl.1954.

- D 33 *Sorbus americana* Marsh. (*S. micrantha* D.-Cours.)
Østlige USA. Det.
- D *Staphylea trifolia* L. Østl. Nord-Amerika. Indsamlet sept.
1949 (121/50) af P.C. Nielsen i Baker Exp. woodlot,
East Lansing, Michigan. Pl. 1954.
- D *Rhododendron luteum* Sweet. Ø-Europa, Lilleasien. AO. 1938.
- D *Cedrus Deodara* (Roxb.) Loud. Himalaya. AO. 1948. Det.
- D *Pinus Coulteri* Don. Californien. Frø 433-1948 fra M. Westergaard. Pl. 1954. (Heromkr. findes grus et spadestik nede.)
- D *Pinus Pinaster* Ait. Middelhavslandene. Frø 612-1950 fra Bagshot Heath, Windsor Forest. Pl. 1954.
- D *Sciadopitys verticillata* (Thunb.) S. & Z. Parasoltræ.
C-Japan. Frø fra FH. sæt 1948.
- D *Corylopsis Veitchiana* Bean. C-Kina. Frø 548-1950 fra Rochester, N.Y.
- D 37 *Pinus koraiensis* Sieb. & Zucc. Japan, Korea. 1890.
Det. JL. 49: Står i florale karakterer M.5 overordentlig nær og må betegnes som en P.k. Afviger imidlertid fra FH.M.5 ved større nålelængde og især ved de sylformet tilspidsede knopskæl (ca. 3 mm lang spids).
- D *Pinus Gerardiana* Wall. NV-Himalaya. Frø 365-1950 fra Afghanistan ved mag. Køie.
- D 38 *Viburnum trilobum* Marsh. Nord-Amerika. Det.
- D 39 *Lonicera gracilipes* Miq. Det. KG. 39. T
26/4-43: Skyder kraftigt fra roden. Sept. 54: Meg. svag
- D 40¹ *Quercus imbricaria* Michx. Østl. USA. Alnarp 1891. Det.
- D 40² *Rhododendron mucronulatum* Turcz. N-Kina, Korea, Japan.
Indsaml. af Østergaard på Feng Hwang Shan (bjerg) i S-Manch. Aksel Olsens plsk. 1936. Det.
SL. 1950: Tidl. blomstr. 26/3. Første hvide udsprungne anemone under linden 27/3.
AO. 55: Øvrige planter af dette frøparti døde. Arten plejer at blomstre endnu tidligere.

- D *Corylopsis glabrescens* Fr.& Sav. Japan. Det.JL: x pauciflora? Frø 550-1950 fra Rochester, N.Y.
- D *Exocorda racemosa* -krydsning. Stikl.695-1950 fra Arboretet IV.5. Det.JL: Næsten steril. Overordentlig rigtblstr. og bredtvoksende busk. Pl.1953.
- D *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. Dværgcitron, N-Kina, Korea. AO.1954.
- D *Ledum groenlandicum* var. *compactum* Bean. Grønland, N-Amr. AO.1929. Flyttet fra P 1954.
- D *Skimmia japonica* Thunb. Japan. ♂ AO.1954. (To med hvide, to med røde blomsterknopper.)
- D *Rhododendron Kosterianum* Schneid. (*R.japonicum* x *molle*).
- D *Cedrus libani* Loud. Lilleasien, Syrien. AO.1948. Flyttet fra Arboretet 1954.
- D 41 *Abies homolepis* Sieb.& Zucc. Japan. 1890. Det.KG.39 og JL.51.
- D 42 *Lonicera Ledebourii* Eschsch. Californien. 1890, Muskau i Schlesien (sub.nom. *L.petrolitanus*). Det.JL.54.
- D 43 *Lonicera Xylostemum* L. Dunet Gedeblad, Europa til Altai. Det.
- D 43² *Sorbus aucuparia* L. Alm.Røn. Europa, Asien. Det.
- D 45 *Larix sibirica* Ledeb. Sibirisk Lærk. 1890. Det.
- D *Tsuga canadensis* (L.) Carr. Østlige Nord-Amerika. Det.
- D 46 *Lonicera orientalis* Lam. Lilleasien. 1891. Det.JL.51 (kulsorte frugter, sammenvokset to og to).
- D 46¹ *Ptelea trifoliata* L. Læderkrone. Østl.Nord-Amerika. Det.

- D *Blechnum* sp. Kambregne fra Balmoral i Skotland hjemført af SL.
- D 49 *Myrica Gale* L. Mosepors. Det.
- D 50 *Corylopsis spicata* Sieb.& Zucc. Japan. Hesse 1911. Det.
- D 51 *Picea orientalis* (L.) Link. Kaukasus, Lilleasien. 1891.
Det. 13/6-42: Lidt svedet.
- D *Rhododendron*
- D *Clethra alnifolia* L. Østlige USA. AO.1954.
- D *Betula lenta* L. Sukkerbirk, østl.Nord-Amerika. Rafn 1906.
Det.
- D *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. Indsamlet af P.C.Nielsen i Kentucky 196-1950. Pl.1953.
- D 56 *Picea Abies* var. Pl.ca.1890.
- D 57 *Crataegus submollis* Sarg. Østl.Nord-Amerika. Det.KG.44
(Sub.nom. *C.tomentosa* L.).
- D 58 *Alnus subcordata* x *glutinosa* (tidl.benævnt *A."subcordata"*).
Frø fra 1914 af FH.C.321(den tetrapl. *A.subc.*, som døde efter de strenge vintre 1939-42).
Krydsningen triploid ($2n = 42$, M.Westergaard 1938), jfr. Lbh.s årsskrift 1941 p.44-58: *Alnus* studies.
13/6-42: Stærkt beskadiget, bryder kun spredt i kronen.
16/10-42: Toppen død, stadig tilbagegang i øverste del.
Forneden helt normal. Der kan ikke findes spor af *Cryptospora* eller andre svampe (Plantepat.afd., Lbh.).
Jan.55: Endnu nogle få grene levende.
- D 59 *Crataegus flabellata* (Spach) Kirchn. Det.KG.44: Eksemp1.
sv.ret nøje til det, vi i gl.dage kaldte *C.coccinea*.
Det.JL.51.
- D 60 *Crataegus pratensis* Sarg. Frø 1902 fra Arnold Arboret.
Det.KG.44 og JL.51.
- D 61 *Juglans Sieboldiana* x *cinerea* (FH.A.14 x Bot.Have). S.1930.
(Jfr.Lbh.s årsskrift 1937 p.138 og 173-74.)
11/5-39: Første gang iagttaget hanblomster.
Okt.54: Højde 16,5 m, omfang 88 cm (sv.til diam. 28 cm)

- D 62 *Quercus borealis* var. *maxima* Ashe, Rødeg. Østl.N-Amerika.
Rafn 1906. Sæet på blivestedet. Det.
SL.21/10-47: D.62 har i såningen FH.103-1936 givet et
særlig smukt afkom med hensyn til affarvningen. Alle
planter meget stærkt røde.
- D *Viburnum tomentosum* Thunb. Japan, Kina. Plante fra gr.A.
- D *Nothofagus Dombeyi* Bl. Frø 429-1950 fra Argentina. Pl.1954.
- D *Quercus Turneri* var. *pseudoturneri* (Schneid.) Henry
Podning fra FH.C.95. Pl.1954.
- D 63 *Juglans mandshurica* Maxim. Manchuriet, Amurland. Frø 1928
fra FH.D.90.JL.51: Mon helt ren (frugter ikke set).
- D *Fagus lucida* Rehd.& Wils. V-Kina. Podekviste fra Arnold
Arboret 293-1950. Pl.1952.
- D 64 *Betula lutea* Michx. N-Amerika. Rafn 1906. Det.
- D *Sinarundinaria Murielae* (Gamble) Nakai, C-Kina. Gul Bambus
AO.1954. Det.
- D 66 *Crataegus submollis* Sarg. Østl.Nord-Amerika. Frø 1902 fra
Arnold Arboret. Det.KG.44 og JL.51.
- D *Fagus grandifolia* Ehrh. Østl.Nord-Amerika. Frø 1947 fra
D.F.S., Ottawa (S.1129). Pl.1952.
- D 68 *Quercus coccinea* Muenchh. Østlige USA. Rafn 1906.
13/6-42: Stærkt beskadiget, bryder kun svagt oppe i
kronen.
- D *Fagus Sieboldii* Endl. Japan. Podekviste (295-1950) fra
Arnold Arboret. Pl.1952. Maj 1954: Blomster.
- D *Viburnum tomentosum* var. *sterile* K.Koch, Japansk Snebolle
DTP. Pl.1952 (nær hegnet).
- D 72 *Quercus palustris* Muenchh. Sumpeg. Østlige USA. Rafn 1906
Det.
- D 73 *Quercus Bebbiana* Schneid. (*Q.macrocarpa* x *alba*). Østl.USA.
Rafn 1904 (sub.non. *Q.macrocarpa* Michx.).
Det.JL.51: Ant.Q.B.

- D *Castanea crenata* Sieb.& Zucc. Japan. Frø 170-1949 fra
A.H.Graves, Connecticut. Pl.1952.
- D 74 *Quercus borealis* var. *maxima* Ashe (*Q.rubra* Du Roi). Rødeg.
Østlige Nord-Amerika. Rafn 1904.
Det.JL.51 (noget afvigende fra typen).
- D *Symphoricarpos occidentalis* var. *Heyeri* Dieck, Colorado.
- D 75 *Quercus petraea* Lieblein (*Q.sessiliflora* Salisb.). Vintereg
Europa, V-Asien. Rafn 1904. Det.
- D *Diervilla splendens* (Carr.) Kirchn. (*D.sessilifolia* x
D.Lonicera). Det.
- D 78 *Crataegus submollis* Sarg. Østl.Nord-Amerika. Frø 1902 fra
Arnold Arboret (sub.nom. *C.arnoldiana* Sarg.).
Det.KG.44 og JL.51.
- D *Quercus mongolica* var. *grosseserrata* (Bl.) Rehd.& Wils.
Frø 360-1950 indsamlet af Zehngraft fra Kwang Nun i
Korea. Pl.1954.
- D *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Bl. Syd-Amerika. Frø modtaget
fra N.J.Larsen. S.197-1936, pl.1944.
- D 79 *Corylus cornuta* March. 1924 ved roddeling i FH. Det.
- D *Castanea mollissima* Bl. Kina, Korea. Frø 171-1949 fra
A.H.Graves, Connecticut. Pl.1952.
- D *Fagus Sieboldii* Endl. Japan.
- D *Fagus sylvatica* var. 'Fasanbøgen', Jægerspris.
Podn.V.267-1938 af typiske vrang skud. Pl.1944.
- D 81 *Crataegus elliptica* Ait. Frø 1902 fra Arnold Arboret. Det.
- D *Quercus Jackiana* Schneid. (*Q.bicolor* x *alba*).
Det.JL.51 (ikke helt sikker).
- D 82 *Carya glabra* (Mill.) Sweet Østl.Nord-Amerika. Rafn 1904
(sub.nom. *C.alba* K.Koch). Det.KG.41: Særlig god C.g.
Det.JL.49: Sikker C.g. - Tyndkvistet m.glatte blade og
skud. Bark på stammen jævn. Frugter ret små. Hasen
spalter kun til midten.

- D 83 *Carya laciniosa* (Michx.f.) Loud. Østl.Nord-Amerika.
Rafn 1904. JL.7/10-49: Afviger fra D.88 ved plane,
smukt formede småblade, smuk gul høstfarve, mindre
knopper og svagere vækst.
- D *Corylus Avellana* var. *contorta* Bean, Aksel Olsen ca.1951.
- D 87 *Carya glabra* x *ovata*. Rafn 1904(sub.nom. *C.glabra* Sweet).
Det.JL.49: Er sikkert *C.g. x o.* Barken har svagt tilløb
til at flosse, grenbygningen er åben, mens D.82 har
mere filtret forgrening m.nedhængende stammeskud samt
jævn bark.
- D 88 *Carya laciniosa* (hybr.?). Rafn 1904 (sub.nom. *C.alba* K.K.).
Det.JL.49: Synes at være *C.l. x ?* Unge grene glabrescent
endeknopper ca. $1\frac{1}{2}$ cm. Stambark noget afskrællende.
Grønne has meget tyk (0,9 cm), spalter helt til grunden
Jfr.D.83.
- D *Castanea mollissima* Bl. Kina, Korea. Frø 77-1950 fra
Arnold Arboret. Pl.1953.
- D 91 *Orixa japonica* Thunb. Japan. 1890. Det.
- D *Quercus Robur* var. Frøplante (S.240-1935) efter Hængeeg fra
Grønholt Hegn (fig.121 hos Oppermann i SSF, bd.2, p.225
Pl.1943. Det.
- D *Lycium chinense* Mill. Bredbladet Bukketorn. Ø-Asien.
- D *Lycium halimifolium* Mill. Alm.Bukketorn. Det.
- Bank ---
- D *Hypericum calycinum* L. SØ-Europa, Lilleasien. Ca.1935 fra
Nordfeld på Møen og villahave i Charlottenlund. Det.
- D 101 *Juniperus Sabina* var. *tamariscifolia* Ait. Det.
- D *Juniperus communis* L. Alm. Ene. Det.
- D *Picea Abies* var. *nana*. (40 cm høj dværgform.)
- D *Juniperus chinensis* var. *japonica* (Carr.) Lav.
Det.JL.51 (var.*japonica* ?).
- D *Juniperus Sabina* var. *tamariscifolia* Ait. Stikl.V.160-1937
fra FH.C.350. Det.

- D *Cytisus praecox* Bean (*C. multiflorus* x *purgans*). Vårgyvel.
Det.
- D 102 *Thujaopsis dolabrata* var. *nana* Endl. Det.
- D *Cotoneaster adpressa* Bois. Ant. Rock 13475, indsamlet okt.
1925 i C-Kansu mellem klipper, 32-3500 m.o.h.
Det.KG.40 og JL.51(?).
- D *Juniperus squamata* var. *Meyeri* Rehd. Det.
- D *Chamaecyparis obtusa* (S. & Z.) Endl. Det.
- D *Potentilla fruticosa* L. 'Månelys'. Pl.1945. Det.
- D *Picea Abies* -dværgform.
- D 103 *Berberis verruculosa* Hemsl. & Wils. V-Kina. Det.
- D *Cotoneaster microphylla* Lindl. Himalaya. Det.
- D *Abies balsamea* var. *nana* (Nels.) Carr. AO.1945. Det.
1955: Svag.
- D *Juniperus scopulorum* Sarg. Vestl. Nord-Amerika. Pl.1951.
- D *Thuja occidentalis* -dværgform. Det.
- D 105 *Chamaecyparis Lawsoniana* var. *Smithii argentea*. Frø fra
FH.C.355 sæt ca.1933 (S.263).
- D *Juniperus virginiana* var. *tripartita* SÉNÉCL. Det.JL.51(?).
- D *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa* -dværgform.
- D *Hypericum calycinum* L. Det.
- D *Thuja occidentalis* var. -dværgform. Det.
- D *Juniperus virginiana* var. *albo-spicata* hort. Det.JL.54.
- D *Cytisus purpureus* Scop. S-Østrig, Italien.

- D 106 *Picea glauca* var. *conica* Rehd. Pl.1945. Det.
- D *Chamaecyparis obtusa* var. *nana compacta* hort. Stikl.V.124-1938 fra Hørsholm Kirkegård.
- D *Chamaecyparis obtusa* (S. & Z.) Endl. Stikl.V.126-1938 fra e af træerne FH.U.51.
- D *Berberis candidula* Schneid. C-Kina. Det.
- D 108 *Juniperus chinensis* L. Kina, Mong., Japan. Det. Smukt eksemplar.
- D *Pinus Mugo* var. *pumilio* (Haenke) Zenari Det.
- D *Juniperus communis* L. Frøplanter fra Villingeby i Nord-Sjælland, S.934-1946. Pl.1952.
- D *Calluna vulgaris* (L.) Hull. Hedelyng fra Vinderup i Jylland
- D 110 *Pinus Cembra* L. Alperne, N-Asien. Køster 1904. Det.
- D *Thuja occidentalis* L.
- D 111 *Juniperus chinensis* L. ♂ og enkelte ♀. Ca.1890. Det. 13/6-42: Lidt sveden.
- D 113 *Juniperus chinensis* var. *Pfitzeriana* Spaeth. 1890. Det.
- D *Picea Omorika* (Pan.) Purk. SØ-Europa.
- D *Juniperus virginiana* var. Pl.1952.
- D *Juniperus communis* L. N-Amerika, Europa - V-Himalaya og NØ-Asien. Frø fra N-Kina, AO.^S plsk. 1951. Det.
- D 115 *Juniperus virginiana* var. *pyramidalis* Carr. AO.1951 (sub. nom. *J. Sabina* var. *fastigiata* Beiss.). Det.
- D *Juniperus virginiana* var. ? AO.1951 (sub. nom. *J. v.* var. *Kosteri* Beiss.). Det. JL.51: Varietet ?
- D *Juniperus chinensis* L. Kina, Mong., Japan. AO.1951 (typisk Det. JL.51: Langnålet form.

- D *Juniperus communis* var. *candelabrifomis* hort. AO.1951.
- D *Juniperus communis* var. *depressa* Pursh. AO.1951(sub.nom. J.&c.var.*prostrata* Beiss.). Det.JL.54: Var.ikke sikker.
- D 117 *Thuja occidentalis* var. *fastigiata* Jaeg. Stikl.V.180-1937 fra FH.H.4. (Sml.frøplanter fra samme på den anden side gangen.) Pl.1944.
- D *Juniperus Sabina* var. *tamariscifolia* Ait. Stikl.V.160 fra tidl.FH.C.350. Pl.1951.
- D *Juniperus chinensis* var. *japonica* (Carr.) Lav. Stikl.V.157 fra FH.P.7. Pl.1951.
- D *Juniperus chinensis* var. *stricta* hort. AO.1951.
- D *Juniperus Sabina* L. Europas bjerge, Kaukasus, Sibirien. AO.1951 (russisk).
- D 119 *Juniperus virginiana* var. *pyramidiformis* D.Hill. AO.1951 (336-51).
- D *Juniperus horizontalis* Moench. Nord-Amerika. AO.1951: Blå type.
- D *Juniperus chinensis* var. *globosa* Hornibr. AO.1951.
- D *Juniperus virginiana* var. *reptans* Beiss. AO.1951.
- D *Juniperus virginiana* var. *Burkii* hort. AO.1951. Det.JL.5: Svarer nærmest til J.v.var.*venusta*(E.& B.) Rehd..
- D *Juniperus virginiana* var. *tripartita* Sénécl. Stikl.V.162-1946. Pl.1951.
- D 120 *Cupressus arizonica* Greene Indsamlet af Al Johnson (Arno Arboret) i Rucker Canyon, Chiricahua Mts., Coronado i Arizona (55/50). Sæet 1950, pl.1953.

Gruppe E

- E 1 *Decaisnea Fargesii* Franch. Vest-Kina. Hesse 1908.
Det.JL.51.
- E *Quercus libani* Oliv. Syrien, Lilleasien. AO.1951.
Det.JL.51.
- E 2 *Xanthorrhiza simplicissima* Marsh. (*Zanthorrhiza apii-*
folia L'Hérit.). Østlige USA. Det.JL.51.
- E *Clematis recta* L. C-Europa og N-Asien. Det.JL.54.
- E 7 *Decaisnea Fargesii* Franch. Hesse 1908. Det.JL.51.
- E 8 *Quercus Frainetto* Ten. (*Q.conferta* Kit.). Balkan, Syd-
Italien. AO.1941. Pl.1944. Det.JL.51.
- E 19 *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. Østlige N-Amr.
Det.JL.51.
- E 20 *Quercus bicolor* Willd. Østlige Nord-Amerika. Rafn 1914.
Det.JL.49: Er ikke ren, men har mange af *Q.b.*^s
karakterer.
- E 25 *Quercus macranthera* Fisch. & Mey. Kaukasus - Persien.
Rafn 1914. Det.JL.51.
- E 31 *Chamaecyparis nootkatensis* (Lamb.) Spach Alaska til
Oregon. Frø 1911 fra FH.H.36. Det.JL.51.
- E 32 *Chionanthus virginicus* L. Sneflokketræ. Østlige USA.
1890. Det.JL.51.
- E 33 *Quercus imbricaria* Michx. Laurbæreg. Østlige USA.
Rafn 1914 (sub.nom. *Q.Phellos* L.). Det.JL.49.
- E 35 *Fagus sylvatica* L. Podning V.436-1939 af tidlig ud-
springende Bøg fra Egebjerggård på Fyn.
Det.JL.51.

Gruppe F

- F Rhododendron, se særlig fortegnelse på flg.side.
- F Hypericum patulum var. Henryi Bean, Kina.
Pl.1954 (også ved F.11).
- F 1 Magnolia acuminata L. Sydøstl.Nord-Amerika. Det.
- F 4 Magnolia acuminata L. Det.
- F 6 Magnolia Sieboldii K.Koch (M.parviflora S.& Z.). Japan,
Korea. Frø 287-1935 fra Rafn. Plante flyttet fra
Arboretet 1951.
- F 8 Magnolia x Soulangeana Soul. (M.denudata x liliflora)
'Alexandrina'. 1890.
- F 9 Magnolia longifolia 1890.
- F 10 Magnolia x Soulangeana var. Lennei (Topf) Rehd. 1890. Det.
- F Pseudosasa japonica (S.& Z.) Mak. Japansk Bambus. Det.
- F 11 Catalpa ovata Don. Kina. Frø 242-1936 fra Zagreb (sub.nom.
C.speciosa W.). Pl.1944. Det.
- F Magnolia Sieboldii K.Koch Frø 3-1949 fra Arboretet. Pl.1953
- F Catalpa bignonioides Walt. Sydøstl.USA. Frø 234-1936 fra
Brno. Pl.1944. Det.
- F 12 Magnolia amabilis
- F 13 Magnolia acuminata L. Sydøstl.Nord-Amerika. 1890. Det.
- F 14 Magnolia x Soulangeana Soul. 'speciosa'. 1890.
SL.22/5-49: Smuk, sentblomstrende, lyserød, ligner
M.xS.'Alexandrina'. Falder i blomstringstid sammen med
var.Lennei. F.8 og 9 er afblomstrede.
- F 16 Magnolia denudata Desr. C-Kina. 1890.

RHODODENDRON

i grupperne F, G og H og tilgrænsende dele af B og I.

Anmærkninger og forkl. uden navn er givet af Aksel Olsen jan. 1955.

Gruppe F fra sydøstlige hjørne under F.1 mod nord-
vest forbi F.16 til F.11

- F Rhododendron Morelianum Lem. (R.catawbiense x ponticum).
DTP.1944. FP.9/6-54: Kraftig plante med et overflod
af blomster (lys blåviolette m.rødbrune ganepletter).
Ses ikke, at planten er flyttet hertil i år.
- F R. hybr. 'Parsons Gloriosum'. DTP.1953.
FP.9/6-54. En catawb.hybrid.
- F R. hybr. 'Goldworth Crimson'. DTP.1953.
FP.54: Ant.en catawb.hybr. Fink Pearl agtige blomster
- F R. catawbiense hybr. AO.1948.
FP.9/6-54: Som 'Parsons Gloriosum', men mindre blomster
- F R. Schlippenbachii Maxim. Korea, Manch., Japan. AO.1938.
- F R. hybr. Gl.plante.
- nær
F.1 R. hybr. 'Louis Pasteur'. DTP.1950.
- F R. hybr. 'Cunninghams White' (caucasicum hybr.). AO.1953.
- F R. catawbiense var. grandiflorum (sandsynl. catawb.hybr.).
D.T.Poulsens plsk. 1953.
- nær
F.16 R. hybr. 'Prof.Bettex'. AO.1953. Hybriden fremelsket af
den hollandske planteskolemand den Ouden. Smirnowii
præger vækst, løv, blomstens form og hårdføreheden -
arboreum præger sandsynligvis farven.
- F R. hybr. 'Van der Hoop'. DTP.1953. Lign.opr.som 'P.Bettex
- F R. ponticum var. roseum Sweet. AO.1953. Mere frostfær end
typisk R.ponticum, men ellers tyder intet på hybrid-
isering.
- F R. catawbiense hybr. Aksel Olsens plsk.1953.